

Cyperus globosus

3749. — *Cyperus globosus* All. — Plante annuelle de 20-30 cm., glabre, à racine fibreuse ; *tiges* fasciculées, grèles, dressées, *triquètres* ; feuilles linéaires-étroites (1-2 mm.), à carène non saillante, presque lisses ; inflorescence en tête globuleuse ou en ombelle à 2-3 rayons inégaux, dépassée par 2-3 feuilles florales étalées ; épillets bruns, linéaires, longs de 12-20 mm. sur 2, en têtes grandes et fournies ; axe non ailé ; *écailles oblongues*, pâles aux bords ; 2 étamines et stigmates ; *akène* brun, *ovovale oblong*, *apiculé*, *trois fois plus court que l'écaille*.


Lieux fangeux du littoral méditerranéen : Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales. — Espagne, Italie ; Asie occidentale jusqu'à l'Inde ; Afrique ; Australie. — Juillet-octobre.



Cyperus schœnoides

3750. — *C. schœnoides* Griseb. (*SCHÖENUS MUCRONATUS* L., *GALILEA MUCRONATA* Parlat.). — Plante vivace de 20-40 cm., glauque, à souche rampante-stolonifère ; *tige arrondie, striée* ; feuilles épaisses, canaliculées, larges de 2-4 mm., égalant ou dépassant la tige ; inflorescence en grosse tête terminale très compacte, dépassée par 3 bractées étalées ; épillets brun ferrugineux, gros, ovales-lancéolés, très rapprochés ; axe non ailé ; *écailles larges, ovales-mucronées*, jaunâtres aux bords ; 3 étamines, à longs filets dilatés ; 3 stigmates ; *akène trigone*, *trois fois plus court que l'écaille*.

Sables du littoral méditerranéen, en France et en Corse. — Région méditerranéenne. — Mai-juillet.



Cyperus distachyos

3751. — *C. distachyos* All. (*C. JUNCIFORMIS* Cav.). — Plante vivace de 20-40 cm., glabre, à souche longuement traçante ; *tiges* grèles, dressées, *triquètres au sommet* ; feuilles réduites à des gaines basilaires, la supérieure à limbe court linéaire-étroit ; inflorescence en glomérule latéral dépassé par une bractée dressée, formée de 2-3 épillets noirâtres, longs de 10-15 mm. sur 2-3, peu serrés ; axe non ailé ; *écailles oblongues-mucronulées*, *un peu striées* ; 3 étamines ; 2 stigmates ; *akène obovale-mucronulé*, *plan convexe*, *trois fois plus court que l'écaille*.

Marais saumâtres du littoral méditerranéen : Alpes-Maritimes, Pyrénées-Orientales. — Toute la région méditerranéenne. — Mai-juin.



Cyperus rotundus

3752. — *C. rotundus* L. (*C. OLIVARIS* Targ.). — Plante vivace de 20-40 cm., glabre, à rhizomes grèles se renflant çà et là en tubercules noirâtres ovoïdes-oblongs ; *tiges grèles, triquètres* ; feuilles nombreuses, longues, larges de 2-6 mm., carénées ; inflorescence en ombelle à 4-10 rayons dressés très inégaux, égalée ou dépassée par 2-4 feuilles florales ; épillets brun rougeâtre, linéaires, longs de 10-20 mm. sur 1-2, en fascicules ombelliformes courts ; axe ailé ; *écailles densément imbriquées*, *subaiguës*, *faiblement nervées*, à bords ~~pâles~~ ; 3 étamines et stigmates ; *akène triquétre*, *de moitié plus court que l'écaille*.

Lieux sablonneux humides du littoral méditerranéen : Roussillon, Provence ; Corse. — Europe méditerranéenne ; Asie ; Afrique ; Amérique ; Australie. — Août-novembre.