

3753. — *Cyperus esculentus* L. (C. AUREUS Ten.). — Voisin du précédent. Plante vivace de 20-40 cm., à rhizomes filiformes se renflant çà et là en tubercules subglobuleux; tiges triquêtes; feuilles linéaires-élargies (4-8 mm.), carénées; inflorescence en ombelle à rayons étalés-ascendants, dépassée par 2-4 feuilles; épillets d'un roux doré, longs de 6-12 mm., étalés, en petites grappes spiciformes plus longues qu'eux; écailles lâchement imbriquées, obtuses, multinervées, d'un roux uniforme; 3 étamines et stigmates; akène triquètre, de moitié plus court que l'écaille.

Lieux sablonneux du littoral méditerranéen: Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Région méditerranéenne jusqu'à l'Inde. = Août-novembre.



Cyperus esculentus

3754. — *C. vegetus* Willd. (C. MONANDRUS Roth.). — Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glabre, à souche courte, épaisse, très rameuse, non traçante; tiges triquêtes; feuilles longues, larges de 4-10 mm., carénées, rudes; inflorescence en ombelle grande à nombreux rayons dressés inégaux, dépassée par 4-7 longues feuilles; épillets d'un vert pâle, lancéolés, longs de 6-10 mm sur 2-3, en têtes très fournies et très compactes; axe non ailé; écailles aiguës, trinervées, d'un vert uniforme; 1 étamine; 3 stigmates; akène trigone.

Lieux humides, naturalisé dans le Sud-Ouest: Gironde, Landes, Basses-Pyrénées; Pyrénées-Orientales, Hérault. — Espagne et Portugal; îles Açores et Juan Fernandez. Originaire d'Amérique. = Juillet-octobre.



Cyperus vegetus

3755. — *C. serotinus* Rottb. (C. MONTI L. f.). — Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glauque, à souche rampante-stolonifère; tiges épaisses, triquêtes-comprimées; feuilles longues, larges de 4-10 mm., carénées, presque lisses; inflorescence en ombelle paniculée, à rayons décomposés raides inégaux, dépassée par trois longues feuilles; épillets bruns rougeâtres, lancéolés, longs de 8-15 mm. sur 2-3, très étalés, en grappes spiciformes bien plus longues qu'eux; axe non ailé; écailles lâchement imbriquées, obtuses, pluri-nervées, pâles aux bords; 3 étamines; 2 stigmates; akène obovale-comprimé, d'un tiers plus court que l'ovaire.

Marais et rivières du Midi, jusque dans la Gironde, le Rhône et l'Ain; Corse. — Europe méridionale; Asie occidentale jusqu'à l'Inde. = Juillet-septembre.



Cyperus serotinus

3756. — *C. longus* L. Souchet odorant. — Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, verte et glabre, à souche traçante aromatique; tiges raides, triquêtes; feuilles très longues, larges de 4-10 m., carénées, scabres; inflorescence en ombelle à nombreux rayons grèles longs inégaux, dépassée par 3 longues feuilles; épillets brun rougeâtre, linéaires, longs de 10-20 mm. sur 1 1/2, rapprochés en éventail en fascicules courts; axe ailé; écailles densément imbriquées, obtuses, pluri-nervées, pâles aux bords; 3 étamines et stigmates; akène trigone, trois fois plus court que l'écaille.

Varie, dans le Midi, à ombelle compacte à rameaux courts, épillets plus grands en fascicules denses (C. BADIUS Desf. et C. PRESLI Parl.).

Marais et rivières, dans une grande partie de la France et en Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-septembre.



Cyperus longus