


3762. — *Eriophorum alpinum* L. — Plante vivace de 10-20 cm., glauque, à souche traçante à courts stolons; tiges rapprochées, très grêles, trigones, rudes de haut en bas, nues jusqu'à la base; feuilles inférieures à limbe sétacé très court; épillet solitaire, dressé, petit (6-7 mm.), ovoïde, à écailles roussâtres lancéolées-obtuses; soies peu nombreuses (4-6 par écaille), flexueuses-crêpues, longues de 2 cm. environ, formant une houppe laineuse peu fournie; akène brun, oblong, mucroné, à angles saillants.

Marais et tourbières des hautes montagnes: Jura; Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la haute Provence; Cantal. — Europe centrale et boréale; Amérique boréale. = Mai-juillet.

*Eriophorum alpinum*


3763. — *E. Scheuchzeri* Hoppe (*E. CAPITATUM* Host). — Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à souche longuement rampante-stolonifère; tiges épaisses, arrondies, lisses, munies de gaines un peu renflées; feuilles radicales peu nombreuses, linéaires en alène, canaliculées, lisses; épillet solitaire, dressé, assez gros, subglobuleux, à écailles noirâtres bordées de blanc, acuminées; soies très nombreuses, non crêpues, longues de 15-25 mm., formant une houppe soyeuse très dense; akène brun, obovale mucronulé, à angles peu saillants.

Marais tourbeux des hautes montagnes: Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe centrale et boréale; Amérique boréale. = Juin-juillet.

*Eriophorum Scheuchzeri*

3764. — *E. vaginatum* L. — Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à souche fibreuse, gazonnante en touffe compacte; tiges assez grêles, trigones au sommet, lisses, munies de gaines lâches et renflées; feuilles radicales nombreuses, raides, linéaires-trigones, rudes aux bords; épillet solitaire, dressé, assez gros, ovale, à écailles noirâtres bordées de blanc, lancéolées-acuminées; soies très nombreuses, non crêpues, longues de 2-3 cm., formant une houppe soyeuse très dense; akène brun, obovale, peu ou point mucroné, à angles peu saillants.

Marais tourbeux des hautes montagnes, et dans les plaines du Nord et du Nord-Ouest. — Europe; Caucase, Sibérie; Amérique boréale. = Avril-juillet.

*Eriophorum vaginatum*

3765. — *E. angustifolium* Roth. (*E. POLYSTACHION* L. p. p.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère; tiges subcylindriques, lisses, feuillées; feuilles allongées, linéaires-caniculées, trigones dans le haut, larges de 3-6 mm., à bords presque lisses; capitules 2-6 en ombelle, penchés après la floraison, à pédoncules inégaux, longs ou courts, lisses et glabres; épillets longs de 10-15 mm., ovales-lancéolés, brunâtres; soies longues de 3-4 cm.; akène brun, elliptique-lancéolé, atténué au sommet et apiculé.

Marais et landes tourbeuses, dans presque toute la France; nul dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie et Amérique boréales. = Avril-juillet.

*Eriophorum angustifolium*