

3773. — *Scirpus silvaticus* L. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche épaisse rampante; tiges solitaires, robustes, dressées, trigones à faces convexes, lisses, feuillées; feuilles longues, larges de 8-15 mm., planes, rudes aux bords et à la carène; épillets vert noirâtre, petits, courts (3-4 mm.), ovoïdes, presque tous sessiles et agglomérés en petites têtes, formant une ample panicule composée non ou peu dépassée par 2-3 bractées; écailles obtuses mucronées; 3 stigmates; 6 soies scabres égalant l'akène trigone mucroné.

Bords des eaux et prés humides, dans presque toute la France. — Europe; Caucase, Sibérie; Amérique boréale. = Mai-août.

*Scirpus silvaticus*


3774. — *S. radicans* Schkuhr. — Voisin du précédent. Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, à souche rampante, à tiges fasciculées, les stériles à la fin allongées, couchées-radicantes en forme de stolons; feuilles longues et larges; épillets plus allongés (4-7 mm.), ovoïdes-oblongs, aigus, presque solitaires et portés sur des pédicelles 1-2 fois plus longs qu'eux, non agglomérés; écailles mutiques, la nervure dorsale n'atteignant pas leur sommet; soies lisses, dépassant sensiblement l'akène.

Marais et étangs, dans la Lorraine, où il est rare. A rechercher dans le Nord-Est. — Europe centrale et boréale. = Juin-août.

*Scirpus radicans*

3775. — *S. Holoschoenus* L. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche épaisse rampante; tiges fasciculées, arrondies, fermes, striées, munies à la base de 2-3 gaines à limbe court et triquètre; épillets petits, ovoïdes, en capitules globuleux, très compacts, d'un brun roux ou grisâtre, solitaires et sessiles ou plus souvent en ombelle latérale longuement dépassée par la bractée qui continue la tige; écailles tronquées-mucronées, carénées, ciliées; 3 stigmates; akène nu, très petit, noirâtre, trigone mucroné, lisse.

Lieux sablonneux humides, dans tout le Midi et l'Ouest jusque dans le Morbihan, le Cher, l'Ain; Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-août.

*Scirpus Holoschoenus*

3776. — *S. lacustris* L. *Jonc des chaisiers.* — Plante vivace de 1 à 3 mètres, verte, à souche épaisse rampante; tiges robustes, arrondies, spongieuses, munies à la base de gaines souvent prolongées en limbe court en alène (rarement long et rubané); épillets assez gros, brun ferrugineux, ovoïdes, nombreux, fasciculés, en ombelle un peu latérale ou en tête non ou peu dépassée par la bractée qui continue la tige; écailles émarginées-mucronées, ciliées, non ponctuées; 3 stigmates; 5-6 soies scabres dépassant l'akène gros, gris brun, subtrigone mucroné, lisse.

Rivières et étangs, dans toute la France et en Corse. — Presque tout le globe. = Mai-août.

*Scirpus lacustris*