




Scirpus Tabernæmontani



Scirpus carinatus



Scirpus littoralis



Scirpus triquetus

3777. — *Scirpus Tabernæmontani* Gmel. (*S. GLAUCUS* Sm.). — Très voisin du précédent. Plante glauque, atteignant à peine 1 mètre; tiges plus grêles, à gaines ordinairement non prolongées en pointe foliacée; inflorescence ordinairement en tête assez dense; *écailles florales le plus souvent ponctuées-rudes*; 2 stigmates, rarement 3; *akène plus petit, obovale, non trigone, fortement bombé sur une face, convexe sur l'autre.*

Marécages maritimes et çà et là dans l'intérieur, en France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-août.

3778. — *S. carinatus* Smith (*S. DUVALII* Hoppe). — Plante vivace de 1-2 mètres, verte, à souche épaisse rampante; *tiges arrondies dans le bas, obtusément trigones dans le haut avec 2 faces convexes et 1 plane*, à gaines basilaires souvent prolongées en pointe foliacée; épillets assez gros, brun ferrugineux, ovoïdes, fasciculés, en ombelle latérale non ou peu dépassée par la bractée qui continue la tige; *écailles émarginées-mucronées à lobes subaigus, ciliées, souvent ponctuées-rudes*; 2 stigmates; 5-6 *soies scabres égalant l'akène brun, plan-convexe mucroné, lisse.*

Rivières et étangs : Loire-Inférieure, Charente-Inférieure, Gironde; Rhône et Isère; Alsace. — Europe centrale, d'Angleterre en Hongrie. = Juin-septembre.

3779. — *S. littoralis* Schrad. (*S. TRIQUETER* G. G., non L.) — Plante vivace égalant ou dépassant 1 mètre, glabre, à souche rampante; *tiges robustes, entièrement trigones à angles aigus et faces planes*, à gaines basilaires terminées en limbe court foliacé; épillets assez gros, brun ferrugineux, ovoïdes-oblongs, nombreux, solitaires et fasciculés, en ombelle latérale lâche dépassée par la bractée qui continue la tige; *écailles émarginées-mucronées à lobes obtus, non ciliées*; anthères à mucron cilié; 2 stigmates; 4 *soies velues en pinceau, égalant l'akène brun, plan-convexe, lisse.*

Marais et fossés du littoral méditerranéen : Roussillon, Languedoc, Provence; Corse. — Europe méditerranéenne; Asie occidentale jusqu'à l'Inde; Afrique septentrionale. = Mai-août.

3780. — *S. triquetus* L. (*S. POLLICHI* G. G.). — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche rampante; *tiges entièrement trigones à angles aigus et faces planes*, munies à la base de 2-3 gaines, la supérieure terminée en limbe court foliacé; épillets assez gros, roussâtres, ovoïdes, nombreux, fasciculés, en ombelle latérale un peu lâche ou compacte longuement dépassée par la bractée qui continue la tige; *écailles émarginées-mucronées à lobes obtus, ciliées*; anthères à mucron court et glabre; 2 stigmates; 3-6 *soies scabres, plus courtes que l'akène brun, plan-convexe, apiculé, lisse.*

Rivières et marais, dans tout l'Ouest, l'Est, la vallée du Rhône. — Europe centrale et boréale; Asie tempérée; Afrique australe; Amérique boréale. = Juillet-septembre.