




Carex mixta

3838. — *Carex mixta* Miégeville. — Plante vivace de 15-25 cm., glabre, à souche gazonnante; tige penchée, obtusément trigone, molle, lisse; feuilles plus courtes que la tige, étroites (2 mm.), rudes; épis parfois solitaires et unisexuels, l'un gynobasique, le plus souvent trois, subsessiles-agglomérés, ovoïdes-oblongs, denses, le supérieur androgyn ou tous femelles; bractée engainante, membraneuse, à pointe fine; *écailles* ovales-aiguës, brunes; 3 stigmates; *utricules* verdâtres, longuement pubescents, petits (2 1/2 mm.), ovoïdes-elliptiques, obscurément nervés, à bec court dépassant l'écaille.

Lieux humides de la région alpine des Hautes-Pyrénées. = Juin-juillet.



Carex nigra

3839. — *C. nigra* All. — Plante vivace de 10-25 cm., glabre, à souche gazonnante; tige dressée, triquète, lisse; feuilles égalant presque la tige, larges de 3-4 mm., un peu rudes; épis 3-5, noirâtres, ovales, tous sessiles et dressés, rapprochés en tête subglobuleuse, le supérieur androgyn, mâle à la base; bractée inférieure foliacée, non engainante, dépassant souvent la tige; *écailles* d'un pourpre noir, ovales-lancéolées; 3 stigmates; *utricules* d'un pourpre noir, bordés de jaune, obovales-trigones (4 mm.), lisses, à bec court égalant ou dépassant l'écaille.

Pâturages et rocaillies humides des hautes montagnes : Alpes de la Savoie, du Dauphiné, de la Provence; Pyrénées. — Europe centrale et boréale; Caucase. = Juillet-août.



Carex atrata

3840. — *C. atrata* L. — Plante vivace de 20-40 cm., glabre, à souche gazonnante; tige penchée au sommet, triquète, lisse ou un peu rude au sommet; feuilles plus courtes que la tige, larges de 3-5 mm., un peu rudes; épis 3-5, noirâtres, oblongs, pédonculés, à la fin penchés, rapprochés, le supérieur androgyn, mâle à la base; bractée inférieure foliacée, non engainante, dépassant souvent la tige; *écailles* d'un pourpre noir, ovales-lancéolées; 3 stigmates; *utricules* fauves ou bruns, ovoïdes-subtrigones (4 mm.), lisses, à bec court égalant à peine l'écaille.

Pâturages et rochers humides des hautes montagnes : Alpes; Cantal; Pyrénées. — Europe; Caucase, Himalaya, Sibérie; Amérique boréale. = Juillet-août.



Carex aterrima

3841. — *C. aterrima* Hoppe. — Voisin du précédent. Plante vivace de 40-80 cm., gazonnante, à tige raide, penchée au sommet, triquète, scabre surtout dans le haut; feuilles plus courtes que la tige, larges de 3-7 mm., rudes; 3-6 épis noirâtres, oblongs-cylindriques, pédonculés, à la fin penchés, rapprochés; bractée inférieure foliacée, allongée, non engainante; *écailles* noirâtres, ovales-lancéolées; 3 stigmates; *utricules* noir brun, ovoïdes-subtrigones (4 mm.), égalant environ l'écaille.

Prairies humides des hautes montagnes : Alpes de la Savoie et du Dauphiné; Pyrénées-Orientales. — Europe centrale. = Juillet-août.