



**3854. — *Carex clavæformis* Hoppe.** — Voisin des deux précédents. Plante vivace de 40-80 cm., verte, non glauque, ayant le port du *C. aterrima*; souche stolonifère; tige élancée, lisse; feuilles larges de 3-6 mm., scabres; 2 épis mâles épais, oblongs-cylindriques, d'un brun foncé; 2-3 épis femelles oblongs en massue, très denses, longuement pédonculés, promptement penchés et d'un brun rougeâtre; bractée inférieure engainante, dépassant la tige; écailles femelles brunâtres, lancéolées-acuminées; utricules rougeâtres, ovoides-elliptiques, plus courts que l'écaille.

Sources et ruisseaux de la région alpine, dans les Hautes-Alpes et la Savoie. — Suisse, Italie, Tyrol, Carinthie, Carniole. = Juin-juillet.

**3855. — *C. hispida* Willd.** — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glauque, à souche rampante-stolonifère; tige robuste, dressée, *subtrigone*, lisse; feuilles longues, très raides, larges de 5-10 mm., scabres; épis mâles 3-5, cylindriques-allongés, bruns, les femelles 3-4, cylindriques, épais, très denses, dressés, subsessiles, panachés de blanc et de brun; bractée inférieure à gaine courte, dépassant la tige; écailles vert brun, lancéolées-aristées ou mutiques; 3 stigmates; utricules verdâtres, *hispidules*, oboval-comprimés (5 mm.), ciliés, nervés, à bec plus court que l'écaille.

Marais et étangs du littoral méditerranéen : Roussillon, Languedoc, Provence; Corse. — Région méditerranéenne. = Avril-juin.

**3856. — *C. riparia* Curt.** — Plante vivace de 50 cm. à 1 m. et plus, glaucescente, à souche rampante-stolonifère; tige robuste, *triquète*, à angles rudes ou 1-2 lisses; feuilles larges de 6-15 mm., scabres; épis mâles 3-5, épais, cylindriques-elliptiques, brun foncé, à écailles toutes aristées; les femelles 2-4, cylindriques, denses, dressés, écartés, les inférieurs pédonculés; bractée inférieure sans gaine, égalant ou dépassant la tige; écailles brunâtres, lancéolées-aristées; 3 stigmates; utricules bruns, *glabres*, dressés, ovoides-coniques (5 mm.), convexes sur les 2 faces, nervés, à bec bifide ne dépassant pas l'écaille.

Bords des eaux, dans toute la France. — Europe; Asie occidentale; Algérie; Amérique. = Avril-juin.

**3857. — *C. acutiformis* Ehrh. (*C. PALUDOSA* Good.).** — Plante vivace de 40 cm. à 1 mètre, glaucescente, à souche rampante-stolonifère; tige triquète, à angles aigus et scabres; feuilles larges de 4-8 mm., scabres; épis mâles 2-4, épais, cylindriques-elliptiques, brun foncé, à écailles inférieures obtuses; les femelles 2-4, cylindriques, denses, dressés, écartés, les inférieurs pédonculés; bractée inférieure sans gaine, égalant environ la tige; écailles brunâtres, lancéolées-acuminées; 3 stigmates; utricules brun gris, *glabres*, dressés, ovoides-trigones comprimés (4 mm.), nervés, à bec bidenté dépassant un peu l'écaille.

Bords des eaux, dans toute la France et en Corse. — Presque tout le globe. = Avril-juin.