



Carex vesicaria



Carex rostrata



Carex montana



Carex pilulifera

3862. — *Carex vesicaria* L. — Plante vivace de 40-80 cm., verte, à souche rampante; tige triquète, à angles aigus et scabres; feuilles égalant à peine la tige, larges de 4-8 mm., scabres; épis mâles 2-3, linéaires, fauves; les femelles 2-3, gros, cylindriques, denses, écartés, dressés ou l'inférieur penché et assez longuement pédonculé; bractées sans gaine, égalant ou dépassant la tige; écailles blanchâtres, lancéolées-acuminées; 3 stigmates; utricules roussâtres, glabres, dressés, vésiculeux, ovoïdes-coniques (6 mm.). nervés, à bec long lisse et bifide dépassant l'écaille.

Bords des eaux, dans presque toute la France. — Europe; Asie occidentale et boréale, Japon; Amérique boréale. = Mai-juillet.

3863. — *C. rostrata* With. (E. OBTUSANGULA Retz, C. AMPULLACEA Good.). — Plante vivace de 30-70 cm., glaucescente, à souche rampante; tige trigone, à angles obtus et lisses; feuilles dépassant la tige, étroites (2-4 mm.), scabres; épis mâles 2-3, linéaires, fauves; les femelles 2-4, cylindriques, denses, assez écartés, dressés, l'inférieur pédonculé; bractées sans gaine, dépassant la tige; écailles roussâtres, lancéolées; 3 stigmates; utricules jaune clair, glabres, étalés-divergents, renflés en vessie subglobuleuse (4 mm.) nervés, contractés en bec fin lisse bidenté dépassant l'écaille.

Bords des eaux, dans presque toute la France. — Europe; Asie occidentale et boréale; Amérique boréale. = Mai-juillet.

3864. — *C. montana* L. — Plante vivace de 10-35 cm., verte, à souche grosse gazonnante; tige dressée ou inclinée, filiforme, subtrigone, rude au sommet; feuilles égalant souvent la tige, larges de 1-3 mm., scabres; épi mâle solitaire, épaissi en massue, noirâtre; 1-3 épis femelles rapprochés, ovoïdes-globuleux, pauciflores, sessiles; bractée inférieure non engainante, membraneuse, aristée; écailles rouges-noirâtres, ovales-mucronées ou émarginées; 3 stigmates; utricules fauves, pubescents, elliptiques-trigones (4 mm.), nervés, à bec court dépassant l'écaille.

Bois et pâturages, çà et là dans une grande partie de la France; Corse. — Europe centrale et boréale; Caucase. = Avril-juin.

3865. — *C. pilulifera* L. — Plante vivace de 10-35 cm., un peu glauque, à souche gazonnante; tige arquée-penchée, filiforme, trigone, un peu rude au sommet; feuilles plus courtes que la tige, larges de 1-3 mm., scabres; épi mâle solitaire, petit, lancéolé, brun fauve; 2-4 épis femelles rapprochés, subglobuleux, denses, pauciflores, sessiles; bractée inférieure non engainante, foliacée, en alène; écailles brunes, blanches aux bords, mucronées; 3 stigmates; utricules gris, pubescents, obovales-subglobuleux (3 mm.), sans nervures, à bec court ne dépassant pas l'écaille.

Bruyères et bois découverts, dans presque toute la France. — Europe; Tauride; Amérique boréale. = Avril-juillet.