


Carex digitata



Carex ornithopoda



Carex ornithopodioides



Carex humilis

3870. — *Carex digitata* L. — Plante vivace de 15-30 cm., verte, à souche gazonnante; tige filiforme, subtrigone, droite, nue, presque lisse; feuilles égalant la tige, larges de 2-4 mm., un peu rudes; épi mâle dépassé par l'épi femelle supérieur, linéaire, brun, pâle; 2-3 épis femelles un peu écartés et digités, dressés, linéaires, lâches, à 3-8 fleurs alternes, à pédoncules saillants; bractées engainantes, membraneuses, rougeâtres; écailles rougeâtres, tronquées-mucronulées; 3 stigmates; utricules verdâtres, pubérulents, obovales-trigones (3 1/2 mm.), sans nervures, contractés en bec très court égalant l'écaille.

Bois montueux, dans une grande partie de la France; nul dans la région méditerranéenne. — Europe; Asie occidentale et boréale. = Avril-juin.

3871. — *C. ornithopoda* Will. — Plante vivace de 8-20 cm., verte, à souche gazonnante; tige filiforme, flexueuse, nue, presque lisse; feuilles égalant la tige, larges de 2-3 mm., rudes; épi mâle égalé ou dépassé par tous les épis femelles, brièvement linéaire, brun pâle; 2-3 épis femelles très rapprochés et digités, un peu divergents, courts, à 4-6 fleurs, à pédoncules inclus; bractées engainantes, membraneuses, brunes; écailles brun pâle, tronquées ou obtuses; 3 stigmates; utricules verdâtres, pubérulents, obovales-trigones (3 mm.), sans nervures, contractés en bec très court dépassant l'écaille.

Coteaux calcaires, dans l'Est, Cévennes, Corbières, Pyrénées. — Europe centrale et boréale; Asie occidentale. = Avril-juin.

3872. — *C. ornithopodioides* Haussm. (*C. subnivalis* Arvet.-T.). — Voisin du précédent. Plante naine de 5-12 cm., à souche courte gazonnante; tiges très fines, arquées, lisses; feuilles plus courtes que la tige, larges de 2-3 mm., lisses; épis petits, fasciculés, à fleurs peu nombreuses, à pédoncules courts et inclus; bractées et écailles d'un brun foncé ou noirâtre; utricules verdâtres, glabres ou glabrescents, petits (2 1/2 mm.), obovales-trigones, à bec très court égalant l'écaille.

Pelouses des hautes montagnes: Alpes du Dauphiné et de la Provence; Hautes-Corbières. — Europe centrale, = Juin-août.

3873. — *C. humilis* Leyss. — Plante vivace de 6-20 cm., verte, à souche grosse gazonnante; tige courte, filiforme, flexueuse, triquètre, rude au sommet; feuilles bien plus longues que la tige, filiformes-caniculées (1 mm.), scabres; épi mâle solitaire, oblong, blanchâtre; 2-4 épis femelles très écartés le long de la tige, très petits, à 2-4 fleurs, à pédoncules inclus; bractées engainantes, membraneuses, blanches; écailles brun blanchâtre, suborbiculaires-mucronulées; 3 stigmates; utricules gris fauve, pubérulents, obovales-trigones (3 1/2 mm.), nervés, à bec très court égalant à peine l'écaille.

Coteaux calcaires secs, dans une grande partie de la France. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale. = Mars-juin.