

- 3890. — *Carex vaginata* Tausch. — Plante vivace de 10-30 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère; tige souvent réfractée au sommet, subtrigone, lisse; feuilles vertes, larges de 4-6 mm., rudes; épi mâle solitaire, oblong en massue, fauve; 2-3 épis femelles écartés, ovales-oblongs, lâches, dressés, pédonculés; bractées engainantes, foliacées, à gaine lâche et renflée, à limbe court et élargi; écailles brunes-roussâtres, ovales-mucronées; 3 stigmates; utricules fauves, elliptiques-trigones (4 mm.), sans nervures, à bec court et bidenté, dépassant l'écaille.

Pentes herbeuses des hautes montagnes : Monts Dore, dans le Puy-de-Dôme; Canigou, dans les Pyrénées-Orientales. — Europe centrale et boréale. = Juin-août.

- 3891. — *C. panicea* L. — Plante vivace de 20-50 cm., glabre, à souche stolonifère; tige dressée ou inclinée au sommet, subtrigone, lisse; feuilles glauques, larges de 2-4 mm., rudes; épi mâle solitaire, oblong-linéaire, brunâtre; 2-3 épis femelles écartés, oblongs-cylindriques, assez lâches, dressés, pédonculés; bractées engainantes, foliacées, à gaine étroite et appliquée, à limbe assez long; écailles brunes-rougeâtres, ovales-lancéolées; 3 stigmates; utricules olivâtres, ovoïdes-renflés (4 mm.), peu nervés, rétrécis en bec court et tronqué dépassant l'écaille.

Prés et bois humides, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale et boréale; Amérique boréale. = Mai-juin.

- 3892. — *C. olbiensis* Jord. (*C. ARDOINIANA* De Not.). — Plante vivace de 30-60 cm., glabre, à souche courte épaisse gazonnante; tige inclinée au sommet, triquétre, lisse; feuilles allongées, larges de 4-8 mm., scabres; épi mâle solitaire, linéaire-allongé, roux pâle; 2-3 épis femelles écartés, oblongs, lâches, à 6-12 fleurs, dressés, pédonculés; bractées engainantes, foliacées, égalant souvent la tige; écailles blanchâtres à carène verte, oboval-épilées; 3 stigmates; utricules roux pâles, oboval-trigones (3 mm.), nervés, atténués à la base, rétrécis en bec oblique court et tronqué ne dépassant pas l'écaille.

Bois secs du Midi : Pyrénées-Orientales, Aude, Hérault, Aveyron, Var, Alpes-Maritimes; Corse. — Italie, Sicile, Herzégovine; Algérie. = Avril-juin.

- 3893. — *C. depauperata* Good. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche courte gazonnante; tige dressée, subtrigone, lisse; feuilles allongées, larges de 3-4 mm., scabres; épi mâle solitaire, linéaire-allongé, fauve pâle; 3-4 épis femelles très écartés, ovales, lâches, à 3-6 fleurs, dressés, pédonculés; bractées engainantes, foliacées, égalant souvent la tige; écailles blanchâtres à carène verte, ovales-mucronées; 3 stigmates; utricules à la fin bruns-pâles, gros (8 mm.), écartés, ovales-renflés, nervés, rétrécis en bec long lisse bidenté, dépassant beaucoup l'écaille.

Bois et forêts, dans une grande partie de la France et en Corse. — Europe centrale et méridionale; Caucase, Kamtschatka. = Avril-juin.



Carex vaginata



Carex panicea



Carex olbiensis



Carex depauperata