



Carex pilosa



Carex strigosa



Carex silvatica



Carex Pseudo-Cyperus

3894. — *Carex pilosa* Scop. — Plante vivace de 20-50 cm., poilue, à souche rampante-stolonifère; tige dressée, grêle, triquètre, lisse; feuilles égalant ou dépassant la tige, larges de 4-8 mm., mollement velues; épi mâle solitaire, oblong, brun rougeâtre; 2-3 épis femelles très écartés, grêles, linéaires, très lâches, dressés ou peu penchés, pédonculés; bractées engainantes, foliacées, à limbe court ne dépassant pas l'épi; écailles brunes-rougeâtres, ovales-mucronées; 3 stigmates; utricules bruns, écartés, ovales-renflés (4 mm.), nervés, rétrécis en bec oblique tronqué dépassant l'écaille.

Bois calcaires de l'Est, depuis les Ardennes et la Lorraine jusqu'à l'Ain et la Savoie; Puy-de-Dôme. — Europe centrale. = Avril-juin.

3895. — *C. strigosa* Huds. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche rampante-stolonifère; tige penchée au sommet, subtrigone, lisse; feuilles molles, larges de 4-10 mm., scabres; épi mâle solitaire, linéaire, roux pâle; 3-6 épis femelles très écartés, très grêles, linéaires-allongés, très lâches, penchés sur de longs pédoncules; bractées engainantes, foliacées, égalant souvent l'épi; écailles blanchâtres à carène verte, lancéolées-aiguës; utricules verts, puis roux, en fuseau trigone (3 1/2 mm.), nervés, insensiblement atténués en bec lisse peu distinct dépassant l'écaille.

Bois humides et rivières, dans le Nord, jusque dans le Rhône et les Deux-Sèvres. — Europe centrale; Caucase. = Mai-juillet.

3896. — *C. silvatica* Huds. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche courte gazonnante; tige penchée au sommet, trigone, lisse; feuilles molles, larges de 3-6 mm., scabres; épi mâle solitaire, linéaire, roux pâle; 3-6 épis femelles écartés, grêles, linéaires-allongés, lâches, penchés sur de longs pédoncules; bractées engainantes, foliacées, égalant souvent l'épi; écailles blanc-verdâtre, lancéolées-cuspidées; 3 stigmates; utricules verts puis roux, ovoïdes-trigones (5 mm.), sans nervures, brusquement rétrécis en bec long et lisse, dépassant l'écaille.

Bois et ravins, dans presque toute la France; très rare dans la région méditerranéenne; Corse. — Europe; Asie tempérée; Algérie; Amérique du Nord. = Mai-juillet.

3897. — *C. Pseudo-Cyperus* L. — Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche courte gazonnante; tige robuste, triquètre à faces concaves, scabre; feuilles dépassant la tige, larges de 6-10 mm., scabres; épi mâle solitaire, linéaire, roux pâle; 3-6 épis femelles la plupart rapprochés de l'épi mâle, gros (4-6 cm.), cylindriques, denses, à la fin pendants, pédonculés; bractées à peine engainantes, foliacées, dépassant beaucoup la tige; écailles vertes, linéaires en alène, rudes; 3 stigmates; utricules verts, à la fin réfléchis, ovoïdes-lancéolés (5 mm.), fortement nervés, atténués en bec long bifide égalant l'écaille.

Bords des eaux, çà et là dans presque toute la France. — Europe; Caucase; Algérie; Amérique boréale, Australie. = Mai-juillet.