

3898. — Carex pendula Huds. (*C. MAXIMA* Scop.). —

Plante vivace atteignant ou dépassant 1 mètre, glabre, à souche gazonnante; tige robuste, triquètre, lisse; feuilles allongées, larges de 8-15 mm., rudes; épis mâles 1-2, longs, grêles, fauves; 4-6 épis femelles écartés, très longs (10-20 cm.), cylindriques, denses, arqués-pendants, pédonculés; bractées inférieures à longue gaine, foliacées, dépassant souvent la tige; *écailles* brunes verdâtres, *lancéolées-mucronées*; 3 stigmates; *utricules* verts, dressés-étalés, *elliptiques-trigones* (3 mm.), sans nervures, à bec court émarginé dépassant un peu l'écaille.

Bois humides et ravins ombragés, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-juillet.



Carex pendula

3899. — C. microcarpa Bert. in Moris (*C. CORSICA* Degl. in Lois.). —

Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche rampante; tige dressée, triquètre, lisse; feuilles glauques, longues, larges de 5-10 mm., rudes au sommet; épi mâle solitaire, long, grêle, brun rougeâtre; 4-6 épis femelles écartés, longs de 4-10 cm., cylindriques, denses, dressés, subsessiles; bractées inférieures engainantes, foliacées, égalant environ la tige; *écailles* rougeâtres, *lancéolées-mucronées*; 3 stigmates; *utricules* brun foncé, dressés, *petits* (2 1/2 mm.), *elliptiques-trigones*, sans nervures, à bec court émarginé dépassant peu l'écaille.

Lieux humides de la région basse et moyenne de la Corse; indiqué en Provence. — Sardaigne et Capraja. = Mai-juillet.



Carex microcarpa

3900. — C. laevigata Smith. —

Plante vivace de 50 cm. à 1 mètre, glabre, à souche épaisse rampante; tige trigone, lisse; feuilles vertes, larges de 4-10 mm., rudes, à 2 ligules, l'une adhérente au limbe, l'autre libre, plus courte, opposée à la feuille; épi mâle solitaire, long, cylindrécé, fauve; 2-4 épis femelles tous écartés, longs de 3-5 cm., cylindriques, denses, dressés ou l'inférieur penché, pédonculés; bractées engainantes, foliacées, plus courtes que la tige; *écailles* rousses, *lancéolées-cuspidées*; *utricules* verdâtres, dressés, *ovoïdes-trigones* (5 mm.), *nervés*, à bec rude bifide dépassant l'écaille.

Lieux humides, dans une grande partie de la France; nul dans l'Est; Corse. — Europe occidentale et centrale; Tauride. = Mai-juillet.



Carex laevigata

3901. — C. binervis Smith. —

Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche gazonnante; tige trigone, lisse; feuilles glaucescentes, larges de 3-6 mm., rudes, à ligule oblongue opposée au limbe; épi mâle solitaire, long, cylindrécé, brun foncé; 2-4 épis femelles tous écartés, oblongs-cylindriques (2-3 cm.), denses, dressés, pédonculés; bractées engainantes, foliacées, plus courtes que la tige; *écailles* brun noirâtre, *ovales-mucronulées*; 3 stigmates; *utricules* bruns tachés de rouge, *ovoïdes-subtrigones* (4 mm.), à 1 forte nervure verte sur chaque face latérale, à bec scabre cilié bifide, dépassant l'écaille; akène à bec droit.

Landes et marais de l'Ouest, des Pyrénées au Pas-de-Calais. — Europe occidentale, du Portugal à la Norvège. = Mai-juin.



Carex binervis