

- 3906. — *Carex extensa* Good. — Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à souche gazonnante; tige subtri-gone, très lisse; feuilles d'un vert pâle, raides, longues, étroites (1-2 mm.), enroulées-canaliculées, rudes au sommet; 1-2 épis mâles, en fuseau, fauves; 2-4 épis femelles rapprochés, ovoïdes-oblongs (8-15 mm.), denses, dressés, subsessiles, l'inférieur souvent écarté; bractée inférieure engainante, toutes filiformes dépassant beaucoup la tige; écailles fauves, ovales-mucronées; utricules verdâtres, ascendantes, elliptiques-trigones (3 1/2 mm.), nervés, à bec court bidenté lisse, dépassant l'écaillle.

Marécages des côtes de la Manche, de l'Océan, de la Méditerranée. — Littoral de la Méditerranée et de l'Océan, de Syrie en Amérique. = Avril-juillet.



Carex extensa

- 3907. — *C. Mairii* Coss. et Germ. — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche gazonnante; tige subtri-gone, rude au sommet; feuilles d'un vert pâle, planes, larges de 2-5 mm., rudes, à ligule opposée au limbe oblongue; épis mâle solitaire, linéaire, fauve; 2-4 épis femelles rapprochés, ovoïdes-oblongs (6-12 mm.), denses, dressés, subsessiles, l'inférieur parfois écarté; bractée inférieure engainante, foliacée, égalant la tige; écailles roux pâle, ovales-mucronées, denticulées-ciliées; utricules verdâtres, étalées, ovoïdes-trigones (4 mm.), nervés, à bec bifide bordé de cils raides, dépassant l'écaillle.


Marécages, aux environs de Paris, dans l'Ouest et le Midi, jusqu'aux Alpes-Maritimes. — Espagne, Algérie. = Mai-juin.



Carex Mairii

- 3908. — *C. flava* L. — Plante vivace de 20-30 cm., glabre, à souche gazonnante; tige dressée, trigone, lisse; feuilles vert clair, larges de 2-5 mm., rudes, à ligule courte; épis mâle solitaire, linéaire, fauve; 2-4 épis femelles rapprochés, ovoïdes-subglobuleux (6-12 mm.), denses, dressés, subsessiles, l'inférieur parfois écarté; bractée inférieure engainante, foliacée, étalée, dépassant beaucoup la tige; écailles fauves, ovales-lancéolées, non mucronées; utricules à la fin jaunes et réfléchis, obovales-renflés (3 mm.), nervés, à bec long bifide non cilié, courbé en bas, dépassant l'écaillle.

Marais et prés tourbeux, dans presque toute la France; nul dans la région méditerranéenne; Corse. — Europe; Algérie; Amérique du Nord. = Mai-juillet.



Carex flava

- 3909. — *C. Oederi* Ehrh. — Plante vivace de 5-25 cm., glabre, à souche très gazonnante; tige courte ou courbée-ascendante, lisse; feuilles vertes, larges de 2-4 mm., égalant souvent la tige; épis mâle solitaire, linéaire, fauve; 2-4 épis femelles rapprochés, ovoïdes-subglobuleux (5-10 mm.), sessiles ou l'inférieur très écarté et pédonculé; bractée inférieure engainante, étalée, plus longue que la tige; écailles jaune verdâtre, ovales-lancéolées; utricules à la fin jaunâtres étalées, mais non réfléchis, petits (3 mm.), subglobuleux, retrécis en bec assez court, fin, toujours droit, dépassant l'écaillle.

Marécages siliceux, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Perse; Amérique boréale. = Avril-octobre.



Carex Oederi