

Genre 817. — **CORYNEPHORUS P. Beauv.**(Du grec *coryné*, massue, *phérô*, je porte : arête épaissie en massue au sommet.)

Épillets comprimés par le côté, à 2 fleurs, l'inférieure sessile et la supérieure stipitée; glumes presque égales, membraneuses, carénées, aiguës, à 1-3 nervures, dépassant beaucoup les fleurs; glumelles un peu inégales, membraneuses, l'inférieure barbue à la base, aiguë, entière, sans nervures, portant sur le dos au-dessus de la base une arête courte, droite, articulée et munie d'une très petite collerette de poils vers son milieu, un peu renflée en massue au sommet; la supérieure un peu plus courte bicarénée, à 3-4 dents; 3 étamines; stigmates latéraux; caryopse glabre, oblong, sillonné à la face interne, adhérent aux glumelles.

Épillets pédicellés, fasciculés, en panicule étalée à la floraison puis resserrée, verte ou violacée; feuilles enroulées-sétacées, à ligule allongée; plantes assez grêles, glabres.

3 espèces habitant l'Europe et la région méditerranéenne.

TABLEAU DES ESPÈCES

- Plante vivace, à souche densément gazonnante; feuilles radicales très nombreuses, fasciculées; panicule étroitement oblongue, à rameaux assez courts et garnis d'épillets presque jusqu'à leur base **C. canescens 4044**
- Plantes annuelles, à racine grêle non gazonnante; feuilles radicales peu nombreuses, non fasciculées; panicule ovale-oblongue, à rameaux à la fin allongés et longuement nus à la base.
- Épillets longs de 3 mm., en fascicules assez petits, formant une panicule très lâche; tiges ordinairement dressées dès la base; arête atténuée en massue filiforme atteignant souvent le sommet des glumes **C. fasciculatus 4045**
- Épillets longs de 4 mm., en fascicules assez gros, formant une panicule assez lâche; tiges genouillées à la base, ascendantes; arête brusquement renflée en massue courte n'atteignant pas le sommet des glumes. **C. articulatus 4046**

4044. — **Corynephorus canescens P. B.** (AIRA CANESCENS L.). — Plante vivace de 10-40 cm., glabre, à souche fibreuse densément gazonnante; tiges dressées ou genouillées-ascendantes, grêles, très nombreuses; feuilles glauques, enroulées-sétacées, scabres, les radicales fasciculées; ligule oblongue; panicule longue de 2-8 cm., étroite, lancéolée-oblongue, à la fin dense, blanchâtre ou violacée, à rameaux courts; épillets de 3 mm., oblongs, fasciculés; poils de la base des fleurs atteignant à peine le 6^e des glumelles; arête insensiblement épaissie en massue égalant à peine les glumes.

Lieux sablonneux, çà et là dans presque toute la France. — Europe occidentale et centrale, jusqu'en Russie. = Mai-août.

4045. — **C. fasciculatus Boiss. et Reut.** (AIRA ARTICULATA VAR. GRACILIS Desf.). — Plante annuelle de 20-40 cm., glabre, à racine fibreuse; tiges dressées dès la base, grêles, fasciculées; feuilles courtes, sétacées, scabres, les radicales non fasciculées; ligule oblongue; panicule large, ovale, étalée dressée, très lâche, à rameaux très longuement nus à la base; épillets grêles, de 3 mm., en fascicules petits et peu fournis au sommet des rameaux; glumes et glumelles étroitement et longuement acuminées; poils de la base des fleurs égalant environ le 5^e des glumelles; arête insensiblement épaissie en massue filiforme égalant souvent les glumes.

Lieux sablonneux du Midi: Roussillon, Languedoc, Provence; Vaucluse, Drôme; Corse. — Région méditerranéenne occidentale. = Mai-juin.



Corynephorus canescens



Corynephorus fasciculatus