

4047. — *Deschampsia caespitosa* P. B. (*AIRA CAESPITOSA* L.). — Plante vivace de 30 cm. à 1 m. 50, glabre, à souche densément gazonnante formée de fascicules très tenaces et difficiles à diviser; tiges dressées, raides; feuilles vertes, planes, larges de 2-3 mm., scabres, souvent très longues; *ligule longue, lancéolée*; panicule ample, étalée, à axe et rameaux scabres; pédicelles plus courts que l'épillet; épillets rapprochés, longs de 3-5 mm., à 2 (rarement 3-4) fleurs fertiles, violacés ou verdâtres; *fleur supérieure à pédicelle long de 1 mm.*; *arête droite, incluse ou peu saillante, insérée vers la base de la glumelle.*

Lieux humides incultes, dans presque toute la France. — Europe; Asie tempérée; Amérique bor. = Juin-août.



Deschampsia caespitosa

4048. — *D. media* Rœm. et S. (*AIRA MEDIA* Gouan). — Plante vivace de 10-80 cm., glabre, à souche densément gazonnante formée de nombreux fascicules grêles peu adhérents et faciles à séparer; tiges dressées, raides; feuilles glauques, enroulées-sétacées, raides, scabres, souvent courtes; *ligule longue lancéolée*; panicule ample, étalée, à axe et rameaux scabres; pédicelles plus courts ou aussi longs que l'épillet; épillets rapprochés, longs de 3-5 mm., à 2 fleurs fertiles, violacés bordés de roussâtre; *fleur supérieure à pédicelle égalant au moins la moitié de sa longueur*; *arête droite, non saillante, insérée vers le milieu de la glumelle.*

Landes et pâturages, dans tout le Midi et le Centre, jusqu'à l'Aube et les environs de Paris. — Espagne et Portugal, Italie, Dalmatie, Bosnie. = Juin-juillet.



Deschampsia media

4049. — *D. discolor* Rœm. et S. (*D. THUILLIERI* G. G.; *AIRA SETACEA* Huds., *A. DISCOLOR* Thuil., *A. UIGINOSA* Weihe). — Plante vivace de 40-80 cm., glabre, à souche fibreuse gazonnante; tiges dressées, raides, longuement nues; feuilles glauques, enroulées-sétacées, raides, rudes; *ligule très longue, acuminée*; panicule contractée après la floraison, lâche, à rameaux flexueux un peu rudes; pédicelles plus courts que l'épillet; épillets rapprochés, longs d'environ 4 mm., à 2 fleurs fertiles, violacés bordés de roussâtre; *fleur supérieure à pédicelle égalant au moins la moitié de sa longueur*; *arête genouillée, très saillante, insérée vers la base de la glumelle.*

Marais et landes marécageuses, dans tout l'Ouest et le Centre jusqu'au Cher. — Europe occidentale et centrale. = Juin-août.



Deschampsia discolor

4050. — *D. flexuosa* Griseb. (*A. FLEXUOSA* L.). — Plante vivace de 30-80 cm., glabre, à souche fibreuse gazonnante; tiges dressées, grêles, longuement nues; feuilles vertes, enroulées-sétacées, presque lisses; *ligule assez courte, tronquée*; panicule contractée après la floraison, très lâche, à longs rameaux flexueux un peu rudes; pédicelles plus longs que l'épillet ou l'égalant; épillets écartés, longs d'environ 5 mm., à 2 fleurs fertiles, panachés de violet et de blanc argenté; *fleur supérieure subsessile, à pédicelle 5-6 fois plus court qu'elle*; *arête genouillée, très saillante, insérée vers la base de la glumelle.*

Bois, pâturages et rochers siliceux, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique et Amérique boréales. = Mai-août.



Deschampsia flexuosa