




Melica ciliata



Melica transsilvanica



Melica Bauhini



Melica minuta

4129. — *Melica ciliata* L. (*M. GLAUCA* Schultz). — Plante vivace de 30-80 cm., glauque, à souche courte rampante; tiges dressées, en touffe; feuilles raides, étroites, plus ou moins enroulées, rudes; gaines ordinairement glabres; *ligule oblongue, souvent déchirée*; panicule spiciforme de 8-15 cm., unilatérale ou cylindracée, assez lâche, à la fin velue-soyeuse blanchâtre ou jaunâtre, à rameaux primaires portant 5-10 épillets; *glumes inégales, acuminées; glumelle inférieure lancéolée-aiguë, longuement velue-ciliée de la base au sommet*.

Varie à épi plus grêle, lâche et peu fourni (*M. NEBRODENSIS* Parl.); à épi long de 12-25 cm., fourni, souvent lobulé ou interrompu à la base, plante plus robuste (*M. MAGNOLI* G. G.).

Lieux secs et arides, dans presque toute la France et en Corse. — Europe; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Mai-juillet.

4130. — *M. transsilvanica* Schur. (*M. CILIATA* G. G.). — Voisin du précédent. Plante vivace de 30 cm. à 1 mètre, dressée, à feuilles d'abord planes, puis pliées; gaines inférieures velues; *ligule oblongue*; panicule spiciforme assez courte (6-10 cm.) et fournie, cylindrique, épaisse, dense, à la fin velue-soyeuse grisâtre ou brunâtre, à rameaux primaires portant 12-20 épillets; *glumes très inégales, acuminées; glumelle inférieure lancéolée, longuement velue-ciliée aux bords de la base au sommet*.

Collines et rochers, dans le Centre et l'Est: Haute-Loire, Doubs; Alsace. — Europe centrale et orientale; Asie occidentale. = Juin-août.

4131. — *M. Bauhini* All. — Plante vivace de 30-60 cm., glauque, à souche fibreuse gazonnante; tiges dressées, en touffe; feuilles raides, enroulées-jonciformes, à gaines glabres; *ligule oblongue, souvent déchirée*; panicule spiciforme de 8-15 cm., unilatérale, un peu lâche et étalée à la floraison, à la fin peu soyeuse et jaunâtre-violacée, à rameaux inférieurs solitaires ou géminés; épillets ovales, à 2 fleurs fertiles; *glumes inégales, l'inférieure ovale brièvement acuminée; glumelle inférieure oblongue subobtus, velue-ciliée de la base au milieu*.

Lieux secs et arides du Midi: Roussillon, Languedoc, Provence; Aveyron; Corse. — Baléares, Italie, Istrie, Croatie, Dalmatie. = Avril-juin.

4132. — *M. minuta* L. (*M. PYRAMIDALIS* Lamk., *M. RAMOSA* Vill.). — Plante vivace de 10-50 cm., glauque, à souche fibreuse gazonnante; tiges dressées ou ascendantes, en touffe; feuilles raides, étroites, enroulées, à gaines glabres; *ligule oblongue, déchirée*; panicule étalée-pyramidale (rarement simple), unilatérale, lâche, à la fin blanchâtre ou violacée, non soyeuse, à rameaux inférieurs géminés ou ternés; épillets dressés puis penchés sur des pédicelles courbés, à 2 fleurs fertiles; *glumes inégales, ovales-lancéolées; glumelle oblongue, glabre, fortement nervée*.

Varie à feuilles planes, panicule grande, plante de 40 cm. à 1 mètre (*M. MAJOR* Sibth., *M. PYRAMIDALIS* Desf.).

Lieux secs et arides du Midi: Roussillon, Languedoc, Provence; Drôme, Ardèche; Corse. — Région méditerranéenne. = Avril-juin.