



Dactylis glomerata

4144. — *Dactylis glomerata* L. — Plante vivace de 20 cm. à 1 mètre et plus, glabre, à souche fibreuse gazonnante; tiges dressées ou arquées à la base, longuement nues au sommet; feuilles vertes, écartées, non distiques, planes ou canaliculées; gaines comprimées; *ligule oblongue, déchirée*; panicule rameuse, lobée, à rameaux inférieurs souvent longuement nus et étalés; *épillets* longs de 5-6 mm., à 3-6 fleurs; *glumes et glumelles à carène ciliée; stigmates latéraux; caryopse oblong, à face interne canaliculée.*

Varie à feuilles glauques, panicule spiciforme dense, glumelle échancrée en deux lobes arrondis (*D. HISPANICA* Roth).

Prés, bois, pâturages, dans toute la France et en Corse. — Europe; Asie tempérée; Afrique et Amérique boréales. = Avril-septembre.

### Genre 839. — CYNOSURUS L. — Crételle.

(Du grec *cynos*, de chien, *oura*, queue : forme de la panicule.)

Épillets comprimés par le côté, les uns fertiles à 2-7 fleurs, les autres stériles entremêlés et très dissemblables, multiflores, ayant la forme de bractées pectinées; glumes presque égales, membraneuses, lancéolées-aristées, carénées, uninervées, plus courtes que les fleurs ou les égalant; glumelles presque égales, l'inférieure membraneuse, convexe et à 3-5 nervures sur le dos, à sommet bidenté et aristé dans l'échancrure; 3 étamines; stigmates latéraux; caryopse glabre, oblong, un peu sillonné en dedans, étroitement enveloppé par les glumelles.

Épillets brièvement pédicellés, densément agglomérés, formant une panicule spiciforme unilatérale, verdâtre, jaunâtre ou un peu violacée; feuilles planes, à ligule membraneuse; plantes glabres ou glabrescentes.

Environ 7 espèces habitant l'Europe, l'Asie occidentale, l'Afrique septentrionale. Plantes élégantes, parfois cultivées comme ornement. La *crételle des prés* donne un foin de première qualité, mais peu abondant.

### TABLEAU DES ESPÈCES

Plante vivace, à souche gazonnante; ligule courte, tronquée; panicule en forme d'épi étroit (3-5 mm.), linéaire, allongé, non hérissé d'arêtes; épillets fertiles à 3-7 fleurs, à glumelle inférieure munie d'une arête bien plus courte qu'elle.

*C. cristatus* 4145

Plantes annuelles, à racine fibreuse; ligule oblongue; panicule spiciforme large de 1-2 cm. en général, ovale ou oblongue, hérissée de longues arêtes; épillets fertiles à 2-3 fleurs, à glumelle inférieure munie d'une arête bien plus longue qu'elle.

Panicule spiciforme très dense, verte ou violacée, à rameaux très courts et brièvement dichotomes; glumelle inférieure lancéolée, scabre dans le haut, à arête 1-2 fois plus longue qu'elle; épillets stériles formés de glumelles longuement aristées et également espacées . . . . . *C. echinatus* 4146

Panicule spiciforme un peu lâche, verte, à rameaux assez longs, plusieurs fois dichotomes, dressés; glumelle inférieure ovale-oblongue, hispide dans le haut, à arête 4-5 fois plus longue qu'elle; épillets stériles formés de glumelles longuement aristées et inégalement espacées . . . . . *C. elegans* 4147

Panicule spiciforme un peu lâche, à la fin jaunâtre et à rameaux assez longs pendants; glumelle inférieure ovale-lancéolée, hispide dans le haut, à arête 2-3 fois plus longue qu'elle; épillets stériles formés de deux glumes lancéolées-linéaires et de glumelles obovales arrondies denticulées. . . . . *C. aureus* 4148