

4182. — *Festuca capillata* Lamk (F. TENUIFOLIA, Sibth.). — Plante vivace de 15-50 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges grêles, lisses ou un peu rudes au sommet, à 2 nœuds; rejets stériles à gaines enroulées, fendues jusqu'à la base; feuilles d'un vert pâle, très fines, capillaires, cylindracées, rudes; ligule très courte, biauriculée; panicule verdâtre, longue de 3-8 cm., oblongue, étroite, à rameaux solitaires; épillets petits (4-6 mm.), elliptiques, à 3-6 fleurs mutiques; glumes inégales, aiguës; glumelle de 3 mm., étroitement scarieuse, aiguë ou mucronulée; ovaire glabre.

Landes, bois et rochers, dans presque toute la France. — Europe, surtout occidentale. = Mai-juillet.



Festuca capillata

4183. — *F. ovina* L. — Voisin du précédent. Plante vivace de 15-50 cm., à tiges grêles ou un peu raides, plus ou moins rudes et anguleuses au sommet, à 2 nœuds; gaines des rejets fendues jusqu'à la base; feuilles moins fines, sétacées, cylindracées, rudes, vertes ou glaucescentes; panicule longue de 3-10 cm., verte ou violacée; épillets plus grands (4-8 mm.), à 3-8 fleurs aristées; glumelle de 3-5 mm., atténuée en arête n'égalant pas la moitié de sa longueur.

Varie à plante basse (10-20 cm.), gaines tubuleuses jusqu'au tiers, panicule courte de 2-3 cm. (F. SUPINA Schur, Alpes, Cévennes, Auvergne, Pyrénées).

Lieux secs et arides, dans presque toute la France. — Europe; Asie tempérée; Amérique boréale. = Mai-août.



Festuca ovina

4184. — *F. valesiaca* Schleich. — Plante vivace de 20-60 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges sillonnées-anguleuses et parfois rudes au sommet, à 2 nœuds; gaines des rejets fendues jusqu'à la base; feuilles glaucescentes, sétacées, comprimées par le côté, sillonnées sur chaque face sur le sec, rudes; panicule verdâtre, longue de 3-10 cm., oblongue, à rameaux solitaires; épillets de 5-8 mm., à 3-8 fleurs aristées; glumes inégales; glumelle de 3-5 mm., atténuée en arête rarement aussi longue que sa moitié.

Varie à feuilles épaisses (0,7 à 1 mm.), subjonciformes, souvent lisses, avec gaines des rejets fendues jusqu'à la base (F. SULCATA Hack.) ou entières jusqu'au tiers ou au milieu (F. LEVIS Hack.).

Lieux secs et arides, dans l'Est, le Midi, le Centre. — Europe; Asie; Algérie; Amérique boréale. = Mai-juillet.



Festuca valesiaca

4185. — *F. duriuscula* L. — Plante vivace de 20-70 cm., glabre, à souche fibreuse; tiges raides, cylindracées ou striées, lisses ou un peu rudes au sommet, à 2-3 nœuds; gaines des rejets fendues jusqu'à la base; feuilles glauques, rarement vertes, raides, subjonciformes (0,6 à plus de 1 mm. d'épaisseur), enroulées-carénées, comprimées par le côté, non sillonnées, ordinairement lisses; panicule verdâtre ou violacée, longue de 3-10 cm., à rameaux solitaires; épillets de 6-10 mm., elliptiques-oblongs, à 4-9 fleurs aristées; glumes inégales; glumelle de 4-6 mm., atténuée en arête courte ou dépassant un peu sa moitié. Espèce polymorphe.

Lieux secs et arides, dans toute la France. — Europe; Asie tempérée; Afrique septentrionale. = Mai-août.



Festuca duriuscula