

*Calamintha officinalis**Calamintha ascendens**Calamintha nepetoides**Calamintha Nepeta*

2875. — *Calamintha officinalis* Moench. (*C. SILVATICA* Bromf.). — Plante vivace de 30-60 cm., velue, à odeur agréable, à souche stolonifère; tige rameuse; feuilles grandes, ovales, à long pétiole, à limbe plus long que large, régulièrement denté en scie, à dents assez profondes, convexes en dehors; fleurs purpurines, grandes, en verticilles lâches rapprochés, à pédoncules communs dépassant les pétioles; calice long de 7-10 mm., glabrescent, à tube droit, à poils de la gorge subinclus, à lèvres très inégales à dents ciliées; corolle dépassant de 15 mm. la gorge du calice, à tube presque droit; carpelles ovoïdes, bruns.

Bois frais, dans presque toute la France et en Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Algérie et Maroc. = Juillet-septembre.

2876. — *C. ascendens* Jord. (*C. MENTHAFOLIA* G. G., non Host.). — Plante vivace de 30-60 cm., velue-grisâtre, à odeur peu agréable, à souche non stolonifère; tige rameuse; feuilles moyennes, ovales arrondies, à long pétiole, à limbe aussi large que long, superficiellement dentées ou crénelées; fleurs d'un blanc rosé, médiocres, en verticilles courts et rapprochés, à pédoncules communs égalant à peine les pétioles; calice long de 6-8 mm., pubescent, à poils de la gorge subinclus, à lèvres très inégales, à dents fortement ciliées; corolle dépassant de 8-10 mm. la gorge du calice; carpelles subglobuleux.

Lieux incultes, dans une grande partie de la France. — Europe occidentale et méridionale, de la Grande-Bretagne à la mer Noire; Algérie. = Juillet-octobre.

2877. — *C. nepetoides* Jord. (*C. MOLLIS* Jord.). — Plante vivace de 30-80 cm., velue-grisâtre, à odeur assez agréable, à souche traçante; tige simple; feuilles moyennes, courtement ovales, à pétiole assez long, à limbe presque aussi large que long, denté en scie, à dents peu profondes; fleurs roses, assez petites, en verticilles très développés et lâches, à pédoncules communs égalant ou dépassant les feuilles; calice long de 5-7 mm., peu pubescent, à poils de la gorge saillants, à lèvres peu écartées et peu inégales, à dents brièvement ciliées; corolle dépassant de 10-12 mm. la gorge du calice; carpelles ovoïdes.

Lieux secs et pierreux des montagnes: Alpes calcaires; Lozère, Aveyron, Pyrénées-Orientales; Corse. — Europe méridionale; Asie Mineure. = Juin-septembre.

2878. — *C. Nepeta* Savi. — Plante vivace de 40-80 cm., velue-grisâtre, à odeur forte peu agréable, à souche courte; tige très rameuse; feuilles petites, pubescentes, courtement ovales, à pétiole court, à limbe presque aussi large que long, finement dentelée; fleurs lilas violacé, assez petites, en verticilles nombreux, compacts, à axes courts et rapprochés; calice long de 4-5 mm., glabrescent, à poils de la gorge saillants, à lèvres rapprochées, à dents presque égales et glabrescentes; corolle dépassant de 8-12 mm. la gorge du calice; carpelles ovoïdes.

Lieux secs et pierreux, dans le Midi, l'Ouest et le Centre; Corse. — Europe méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juillet-octobre.