

2879. — *Calamintha glandulosa* Benth. — Voisin du précédent. Plante vivace de 20-50 cm., verte, glabrescente, à odeur agréable; tige grêle, très rameuse; feuilles petites, glabrescentes, ovales, courtement pétiolées, un peu dentelées ou presque entières, à glandes apparentes; fleurs pâles-violacées ou blanches, petites, en verticilles nombreux, écartés, compacts, pédonculés; calice long de 3 mm. environ, glabrescent, glanduleux, à poils de la gorge saillants, à dents très petites, presque égales, glabres; corolle dépassant de 5-7 mm. la gorge du calice; carpelles oblongs.

Lieux secs et pierreux, dans les montagnes de la Corse.
— Sardaigne, Baléares. = Juillet-septembre.



Calamintha glandulosa

Genre 578. — **MELISSA L.** — *Mélisse.*

(Du grec *melissa*, abeille : fleurs très butinées par les abeilles.)

Environ 4 espèces habitant l'Europe, l'Asie, l'Afrique.

2880. — *Melissa officinalis* L. (M. ALTISSIMA Sibth.).
Citronnelle. — Plante vivace de 30-80 cm., glabrescente ou velue, à odeur de citron très agréable; tige très rameuse; feuilles grandes, ovales, pétiolées, largement crénelées; fleurs blanchâtres ou rosées, 6-12 en verticilles axillaires, espacés, unilatéraux, brièvement pédonculés et bien plus courts que les feuilles; calice poilu, tubuleux en cloche, à 13 nervures, à tube aplati sur le dos, à lèvre supérieure plane et tridentée, l'inférieure bifide; corolle bilabée, à tube saillant, arqué-ascendant, à lèvre supérieure dressée, concave, échancrée, l'inférieure à 3 lobes inégaux; 4 étamines didynames, arquées-convergentes.

Haies, buissons, bois, çà et là dans presque toute la France et en Corse. — Europe centrale et méridionale; Asie occidentale; Afrique septentrionale. = Juin-septembre. — Souvent cultivé et naturalisé.



Melissa officinalis

Genre 579. — **HORMINUM L.**

(Du grec *hormaein*, exciter : plante stimulante.)

1 seule espèce.

2881. — *Horminum pyrenaicum* L. — Plante vivace de 10-30 cm., brièvement pubescente, à souche épaisse oblique; tige simple; feuilles la plupart radicales, grandes, ovales arrondies obtuses, crénelées, longuement pétiolées, les caulinaires petites et sessiles; fleurs violacées, grandes, 4-6 en verticilles nombreux, écartés, unilatéraux, plus longs que les feuilles bractéales; calice glabrescent, à la fin réfléchi, en cloche, à 13 nervures, à gorge nue, à 2 lèvres, la supérieure tridentée, l'inférieure bifide; corolle bilabée, à tube saillant, arqué-ascendant, muni en dedans d'un anneau de poils, à lèvre supérieure dressée, concave, émarginée, l'inférieure à 3 lobes courts et inégaux; 4 étamines didynames, arquées-convergentes.

Pâturages des hautes montagnes : Pyrénées centrales; Savoie, Alpes-Maritimes. — Espagne et Italie septentrionales, Suisse, Bavière, Autriche. = Juin-août.



Horminum pyrenaicum